

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION de la STATION de BORDEAUX (Tél. 92.06.25 et 92.26.94)

ABONNEMENT ANNUEL  
15 F

(GIRONDE, DORDOGNE, LOT-&-GARONNE, LANDES,  
BASSES-PYRÉNÉES, CHARENTE, CHARENTE-MARITIME)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, Chemin d'Artigues, CENON (Gironde)  
C. C. P. : BORDEAUX 6707-65

Supplément N° I au Bulletin Technique N° 65 de Février 1966

1966-3

## AVERTISSEMENTS

### ARBRES FRUITIERS

Tavelure du Poirier - Le temps doux et humide a favorisé le départ de la végétation dans plusieurs secteurs de la Circonscription.

Sur les variétés les plus précoces ayant débourré, des contaminations pourront se produire par les conidies des chancres des rameaux, mais les Périthèces, dont une assez faible proportion est proche de la maturité ne peuvent pour le moment permettre des contaminations par Ascospores.

Toutefois, un premier traitement devrait être appliqué sur les variétés de Poirier dont le débourrement est bien avancé de préférence avec une Bouillie bordelaise à un pour cent ou une spécialité cuprique.

Nous rappelons que dans les vergers atteints l'an dernier par la Tavelure, une solution de Colorants nitrés à 1% appliquée sur les feuilles mortes restées sur le sol permettra de réduire considérablement les risques de contaminations en détruisant les Périthèces.

## INFORMATIONS

Cloque du Pêcher - Si les pluies au début du mois et la rapidité du départ de la végétation n'ont pas permis d'effectuer les traitements au moment du gonflement des bourgeons, il est encore possible d'intervenir avec une spécialité organique de synthèse (captane-ferbame-thirame-zirame).

Cloque du Prunier - (Maladie des Pochettes) Pour éviter la déformation des fruits une spécialité organo cuprique ou organique pourrait être appliquée entre le débourrement et le stade du bouton blanc.

### COLZA

Charançons des tiges - Le temps doux risque de favoriser la sortie des insectes. Nous invitons donc les agriculteurs à surveiller leurs champs aux heures chaudes de la journée.

Dans les champs où les Colza ont atteint le début du développement des tiges et où des insectes ont été observés un traitement insecticide devrait être envisagé.

### VIGNE

Excoriose - Nous avons déjà signalé la réapparition de l'Excoriose cet hiver dans de nombreux vignobles. La période actuelle est très favorable pour effectuer les traitements qui doivent être terminés au plus tard au gonflement des bourgeons. Traiter environ 15 jours après la taille et sur des bois bien ressuyés.

Bordeaux, le 21 février 1966

Le Contrôleur  
chargé des Avertissements  
C. ROUSSEL

L'Inspecteur  
de la Protection des Végétaux  
J. BRUNETEAU

Imprimerie de la Station de Bordeaux  
Directeur-Gérant: L. BOUYX

P130